Standardtherapie bei obstruktiver Bronchitis im Kleinkindalter

Vorbereitung der 3%-Kochsalz(= Natriumchlorid = NaCl)-Inhalationslösung:

2ml 0,9% NaCl aus 5ml Ampulle abziehen
2ml 5,85% NaCl aus 20ml Ampulle abziehen (geöffnete Ampullen nach 24h verwerfen)

beides nacheinander in den Vernebler des Pariboys geben
= 4ml ca. 3% NaCl als Inhalationslösung (= Mucoclear der Fa. Pari mit 4ml 3% NaCl)

Häufiges Inhalationsschema (immer nach Rücksprache mit dem betreuenden Arzt):

	Morgens	Mittags	Abends
NaCl 3%	4ml	4ml	0
NaCl 0,9%	0	0	5ml
Sultanol 3-5gtt (Tropfen)	3-5gtt	3-5gtt	(3-5gtt)
Budenobronch 0,5mg/2ml (Cortison in Kochsalz)	(2ml)	0	(2ml)

Bei fehlender Besserung jederzeit zum Kinderarzt!

Previmed MVZ GmbH
Gesundheitsforum für Kinder- und Jugendmedizin
Römerstraße 32 82205 Gilching
Sitz der Gesellschaft: Gilching, Bayern
Tel: 08105 – 9331 www.previmed.de
Fax: 08105 – 777 153 info@previmed.de
Mobil: 0174 – 990 25 13 rezepte@previmed.de
Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 265442
Sprechzeiten
Mo. Di. Do. 8:10-12 & 14 -17 Uhr
Mi. Fr. 8:10-12 Uhr & nach Vereinbarung
Geschäftsführer Dr. med. Manfred Praun